



(تاريخ الامتحان – الأحد 9-6-2013 م)

جامعة بنها

كلية التربية

نموذج اجابة

قسم / الدراسات الاجتماعية

الفرقة الرابعة - تعليم أساسي

عدد صفحات الأختبار (5 صفحات)

نموذج رقم (2)

المادة /إفريقيا و حوض النيل

زمن الأختبار (3 ساعات)

ملحوظة هامة (برجاء كتابة رقم النموذج على ورقة الأجابة)

أختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2013/2012 م)

أجب عن جميع الأسئلة التالية :

أولاً : أسئلة الأختيار من متعدد من (1-40) (10 درجات)

1- تبلغ المساحة الإجمالية لدلتا النيل حوالي :

أ- 22 ألف كم

2- يحد دلتا نهر النيل من جة الغرب جبل

ج- أبو رواش

3- ساعدت مياه البحر المالحة في تكوين الدلتا من خلال :

أ- إندماج جزينات الطمي

4- إمتدت حافة الدلتا القديمة من رأس خليج السويس في الشرق حتى :

أ- وادي النظرون غرباً

5- تكونت جبهة الدلتا الحالية وهي على شكل قوسي مع قدوم نهر :

أ- ما قبل النيل

6- تغير شكل بحيرة البردويل-شمال سيناء- دليل على حدوث :

ب- هبوط الدلتا

7- فرع النيل القديم الذي يمتد تحت مياه خليج أبو قير حالياً هو الفرع :

ب- الكانوبي

8- يرى ليونز - أن الأنخفاض في الدلتا قديماً اتجه من :

أ- الشرق للغرب

9- إمتدت دلتا النيل داخل البحر بشكل ملحوظ في العصر الحديث في الفترة ما بين القرنين :

ج- السادس عشر والتاسع عشر

10- الخزان الذي يقلل من خطر تركيز التخزين في منطقة واحدة من منابع النيل هو خزان :

ب- بحيرة تانا

11 - منطقة الربيع الدائم في اريتريا توجد في مناطق :

أ- المرتفعات

12- يبلغ معدل أمد الحياة في السودان حوالي

أ- 56 سنة

13- تتركز صناعة تكرير البترول في اريتريا بمدن :

ج- مصوع واسمرة

14- الأقليم المناخي في منطقة حوض النيل الذي يتميز بكبر المدى الحراري اليومي هو الأقليم :

ب- الأستوائي

15- تمثل الهضبة الأريتيرية امتداداً طبيعياً للهضبة :

أ- الأثيوبية

16- بعد بناء السد العالي وخلو المياه من الرواسب ، أصبح لدى المياه في المجرى بعد السد :

أ- قدرة على النحت

17- بعد بناء السد العالي بلغ معدل نحر النهر النوعي في المنطقة المحصورة ما بين أسوان وأسنا حوالي

ج- 2.2 سم

18- قبل بناء السد العالي كانت الرمال التي تحملها رياح الخماسين تتراكم على جانب النيل

ج- الغربي

19- أوضحت دراسة الصور الجوية لبحيرة ناصر وجود عدد كبير من الكثبان الرملية في منطقة الشلال :

ج- الثاني

20- من الأسباب التي ادت إلى تآكل الشواطئ الشمالية لمصر :

أ- نقص الرواسب النهرية وزيادة النحر ب- حركة المد والجزر ج- جميع ما سبق

21- وجود بقايا القلاع التي بنيت في العصر التركي وغمرت الآن بالمياه دليل على :

ج- جميع ما سبق

22- من المحاصيل التي أدت زراعتها لارتفاع منسوب الماء الأرض في التربة المصرية محصول :

ب- الأرز

23- يبلغ طول رحلة نهرا لنيل عبر الصحراء الإفريقية دون زيادة في مياهه مسافة مقدارها :

أ- 2700 كم

24- - تشترك دول تنزانيا- كينيا – أوغندا في إحتواء بحيرة :

ج- فكتوريا

25- يقع خليج كافرندو- وميناء كسيوفو في دولة :

أ- كينيا

26- يبلغ طول نهر المسيسيبي ورافده المسوري حوالي :

ب- 6860 كم

27- من الأسباب التي أدت لزيادة كمية المياه في بحيرة فكتوريا :

ج- كل ما سبق

28- الجبال التي تشمل خط تقسيم المياه ما بين نهر النيل ونهر الكونغو هي :

أ- جبال مغمبيرو

29- تتصل بحيرة كيوجا مع بحيرة البرت بواسطة نيل ألبرت عند شلالات :

ج- مرشيزون

30- يبلغ متوسط التصريفات السنوية للنيل عند أسوان حوالي :

أ- 84مليارم³

31- إقترح بناء سد سنارعلى النيل :

ج- الأزرق

32- يصب نهر (الكاجيرا) في بحيرة :

ب- فكتوريا

33- بدأت المرحلة الأولى من إنشاء (سد أسوان) في عام :

ب- 1900م

34- كان من المقترح إقامة سد على بحيرة فكتوريا – ضمن التخزين القرني لرفع مستوى مياه البحيرة إلى:

أ- 1 متر

35- المشروع الذي كان سيحول مياه النيل في منطقة إقليم السد ، منعاً لضياح المياه في المستنقعات هو :

ب قناة جونجلي

36- المشروع الذي لو تحقق تنفيذه كان سيقفل من خطر تركيز التخزين في منطقة واحدة من النيل هو خزان :

أ- بحيرة تانا

37 - تقوم صناعة الزيوت في السودان على انتاج محاصيل :

ا- السمسم والفول السوداني

38- أوضحت الدراسات ارتفاع نسبة الأيونات الذائبة الحمضية في مياه النهر عن الحد المسموح .ومنها :

ج- البيكربونات

39- تمتد بسطة بحيرة ألبرت - حتى بلدة نيمولي على الحدود :

أ- الأوغندية السودانية

40- يوجد فائق أسوا - ضمن الإقليم المورفولوجي المعروف باسم :

ج- هضبة البحيرات الاستوائية

ثانيا : أسئلة الصواب والخطأ من (41- 80) (10 درجات)

41- تختلف خصائص المياه في سطح بحيرة ناصر عن المياه في قاعها . صواب

42- اثبتت الدراسات العلمية أن جسم السد العالي لن يتأثر بالهزات الأرضية في منطقة بناؤه . صواب

43- يؤثر اختلاف درجة شفافية المياه وحجم العكارة في مياه بحيرة ناصر على الإنتاج السمكي بالبحيرة . صواب

44- زادت معدلات تجريف التربة المصرية بعد بناء السد العالي صواب.

45- توجد علاقة طردية بين بناء السد العالي وزيادة خصوبة التربة المصرية . خطأ

46- يرى (رشدي سعيد) أن تآكل سواحل مصر الشمالية سببه ارتفاع منسوب سطح البحر العالمي . صواب

47- تزيد نسبة ملوحة التربة في شمال الدلتا وتقل كلما اتجهنا جنوباً . صواب

48- تقل معدلات الأمطار الشتوية في العالم عن معدلات الأمطار الصيفية . صواب

49- يتبع نهر النيل في إنحداره من الجنوب إلى الشمال الإنحدار العام لهضبة الأناضول . خطأ

50- أطلق اسم نهر (ستيت) تيما باسم (عين سبأ) اليمينية . خطأ

51- توجد المنابع الشتوية لنهر النيل في إثيوبيا . خطأ

52- تزيد مساحة حوض نهر النيل عن مساحة حوض نهر الكونغو . خطأ

53- يصل لنهر النيل حوالي 80 مليار م³ من المياه سنوياً من بحيرة فيكتوريا. خطأ

54- اللغة التيجرية – التي يتحدث بها سكان شمال وغرب اريتريا - تنتمي للغات السامية القديمة. صواب

55- ترتبط نشأة بحيرة كايوجا- بالحركة المكونة للاخدود الإفريقي العظيم . خطأ

-4-

56- تبلغ نسبة سكان الريف في السودان 85% من إجمالي السكان . خطأ

57- اتصلت بحيرة فكتوريا بنهر النيل منذ حوالي 15 الف سنة . خطأ

58- في رأي علمي - تكونت بعض سواحل فلسطين الجنوبية من الرواسب النيلية . صواب

59- تقع بسطة وادي حلفا النيلية - في منطقة قليلة المطر . صواب

60- من مقترحات مشروعات التخزين القرني بناء سد - الروصيرص- على نهر العطرة . صواب

61- تمتد البسطة الرابعة من بسطات نهر النيل ما بين جوبا إلى الخرطوم . صواب

62- من مميزات مشروعات التخزين القرني على البحيرات السماح لمعظم الرواسب بالتدفق دون عائق أو حاجز. صواب

63- توقف . العمل في قناة جونجلي بسبب الحروب الأهلية التي نشأت في أثيوبيا . خطأ

64- صاحب فكرة بناء السد العالي في مصر هو الايطالي - ليونارد دافنشي . خطأ

65- تحويل مجرى النهر وبناء سدين بعرض المجرى لكشف القاع هي المرحلة الثانية في مراحل بناء السد العالي خطأ

66- بدأ خزان بحيرة ناصر في الإمتلاء بالمياه عام 1971م . خطأ

67- لا تمتد بحيرة ناصر لتشمل جزء من النوبة السودانية . خطأ

68- تم تهجير سكان النوبة السودانية بعد بناء السد العالي إلى مصر . خطأ

69- تختلف بحيرة فكتوريا عن باقي بحيرات الإخدود الإفريقي بأن لها شواطئ مسطحة. خطأ

70- يرى العالم (جون بول) تكون بحيرة هائلة قديماً في منطقة مستنقعات السودان . صواب

71- يعتبر معدل نمو الدلتا المصرية بطيئا مقارنة بدلتاوات أخرى. صواب

72- توضح خرائط دلتا النيل في كتاب وصف مصر- وجود عدد كبير من البحيرات على الضفة اليمنى لفرع دمياط صواب

73- تكونت دلتا فجر النيل من رواسب ناعمة ورمال دقيقة . خطأ

74- بسبب هبوط الدلتا قديماً ظهرت جزيرة أنترووس - الواقعة شرق ميناء الإسكندرية .خطأ

75- يعد فرع رشيد الحالي مماثلاً للفرع الفاتنيتي - القديم . خطأ

76- تطورت فروع الدلتا الشرقية أكثر من فروعها الغربية بعد حركة الإنخفاض . خطأ

77- توجد علاقة طردية في رأي (رشدي سعيد) بين إنطماش فروع الدلتا القديمة وضعف الحكومات المصرية .صواب

78- يرجع السبب في اطماء الأفرع الغربية لدلتا النيل إلى نمو الحشائش البرية وعدم تطهير المجاري المائية.خطأ

79- تؤثر منطقة الضغط المرتفع الأزوري على مناخ حوض النيل بتلطيف درجة حرارتها . صواب

80- منطقة الرهو الأستوائي - تؤدي إلى زيادة كمية الأمطار الشتوية في حوض النيل . خطأ

انتهت الأسئلة

خالص تمنياتي بالنجاح الباهر

أ.د/ إفراج باشا