

## نموذج اجابة

تاريخ الامتحان - الخميس ٢٦-٦-٢٠١٤م

ملحوظة ( الامتحان مكون من نموذج واحد فقط )

جامعة بنها

كلية التربية

قسم / الدراسات الاجتماعية

الفرقة الرابعة - تعليم أساسي

عدد صفحات الأختبار(4 صفحات)

نموذج رقم (1)

المادة /إفريقيا و حوض النيل

زمن الأختبار (ساعتان )

أختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ( 2013-2014 )

أجب عن جميع الأسئلة التالية :

أولاً : أسئلة الأختيار من متعدد من (١-٢٩)

١ - - تكونت جبهة الدلتا الحالية وكانت على شكل قوسي كبير مع قدوم نهر :

أ- ما قبل النيل

٢ - - تغير شكل بحيرة البردويل-شمال سيناء- دليل على حدوث :

ب- هبوط الدلتا

٣ - - فرع النيل القديم الذي يمتد تحت مياه خليج أبو قير حاليا هو الفرع :

ب- الكانوبي

٤ - - تبلغ المساحة الإجمالية لدلتا النيل حوالي :

أ- ٢٢ ألف كم

٥ - - يحد دلتا نهر النيل من جهة الغرب جبل :

ج- أبو رواش

٦ - - ساعدت مياه البحر المالحة في تكوين الدلتا من خلال :

أ- إندماج جزينات الطمي

٧ - - إمتدت حافة الدلتا القديمة من رأس خليج السويس في الشرق حتى :

أ- وادي النظرون غرباً

- ٨ - - تقوم صناعة الزيوت في السودان على انتاج محاصيل :  
أ- السمسم وال فول السوداني
- ٩ - - أوضحت الدراسات إرتفاع نسبة الأيونات الذائبة الحمضية في مياه النهر عن الحد المسموح .ومنها :  
ج- البيكربونات
- ١٠ - - تمتد بسطة بحيرة ألبرت - حتى بلدة نيمولي على الحدود :  
أ- الأوغندية السودانية
- ١١ - - يوجد فائق أسوا - ضمن الإقليم المورفولوجي المعروف باسم :  
ج- هضبة البحيرات الاستوائية
- ١٢ - - إقترح بناء سد سنار على النيل :  
ج- الأزرق
- ١٣ - - يصب نهر ( الكاجيرا ) في بحيرة :  
ب- فكتوريا
- ١٤ - - يرى ليونز - أن الأنخفاض في الدلتا قديماً اتجه من :  
أ- الشرق للغرب
- ١٥ - - الخزان الذي يقلل من خطر تركيز التخزين في منطقة واحدة من منابع النيل هو خزان :  
ب- بحيرة تانا
- ١٦ - - يبلغ معدل - أمد الحياة للسكان في السودان حوالي :  
أ- ٥٦ سنة
- ١٧ - - أدي بناء السد العالي وخلق المياه من الرواسب ، الي ارتفاع طاقة المياه فيها بعد السد واسبابها :  
أ- قدرة على النحت
- ١٨ - - بعد بناء السد العالي بلغ معدل نحر النهر النوعي في المنطقة المحصورة ما بين أسوان وأسنا حوالي :  
ج- ٢.٢ سم
- ١٩ - - قبل بناء السد العالي كانت الرمال التي تحملها رياح الخماسين تتراكم على جانب النيل :  
ج- الغربي
- ٢٠ - - أوضحت دراسة الصور الجوية لبحيرة ناصر وجود عدد كبير من الكثبان الرملية في منطقة الشلال :  
ج- الثاني

٢١ من الأسباب التي أدت إلى تآكل الشواطئ الشمالية لمصر :

ج- جميع ما سبق

٢٢ - من المحاصيل التي أدت زراعتها لارتفاع منسوب الماء الأرض في التربة المصرية محصول :

ب- الأرز

٢٣ يبلغ طول رحلة نهرا لنيل عبر الصحراء الإفريقية دون زيادة في مياهه مسافة مقدارها :

أ- ٢٧٠٠ كم

٢٤ - تشترك دول تنزانيا- كينيا - أوغندا في إحتواء بحيرة :

ج- فكتوريا

٢٥ من الأسباب التي أدت لزيادة كمية المياه في بحيرة فكتوريا :

ج- كل ما سبق

٢٦- الجبال التي تشمل خط تقسيم المياه ما بين نهر النيل ونهر الكونغو هي :

أ- جبال ميمبرو

27- بدأت المرحلة الأولى من إنشاء (سد أسوان) في عام:

ب- ١٩٠٠ م

28- كان من المقترح إقامة سد على بحيرة فكتوريا - ضمن التخزين القرني لرفع مستوى مياه البحيرة إلى:

أ- ١ متر

29- المشروع الذي كان سيحول مياه النيل في منطقة إقليم السد ، منعاً لضياح المياه في المستنقعات هو :

ب قناة جونجلي

### ثانياً : أسئلة الصواب والخطأ من (٣٠ - ٦٠)

٣٠ صاحب فكرة بناء السد العالي في مصر هو الإيطالي - ليونارد دافنشي .-خطأ

٣١- تحويل مجرى النهر وبناء سدين يعرض المجرى لكشف القاع هي المرحلة الثانية في مراحل بناء السد العالي -خطأ

٣٢ بدأ خزان بحيرة ناصر في الإمتلاء بالمياه عام ١٩٧١ م . - خطأ

٣٣ - تمتد بحيرة ناصر لتشمل جزء من النوبة السودانية .- صواب

٣٤ تم تهجير سكان النوبة السودانية بعد بناء السد العالي إلى مصر .- خطأ

٣٥ تختلف بحيرة فكتوريا عن باقي بحيرات الإخدود الإفريقي بأن لها شواطئ مسطحة.- خطأ

٣٦ يعتبر معدل نمو الدلتا المصرية بطيئاً مقارنة بدلتاوات أخرى . - صواب

٣٧-توضح خرائط دلتا النيل في كتاب وصف مصر- وجود عدد كبير من البحيرات على الضفة اليمنى لفرع دمياط - صواب

- ٣٨ تكونت دلتا فجر النيل من رواسب ناعمة ورمال دقيقة - خطأ
- ٣٩ بسبب هبوط الدلتا قديماً ظهرت جزيرة أنترووس - الواقعة شرق ميناء الإسكندرية - خطأ
- ٤٠ يعد فرع رشيد الحالي مماثلاً للفرع الفاتنيتي - القديم - خطأ
- ٤١ تطورت فروع الدلتا الشرقية أكثر من فروعها الغربية بعد حركة الإنخفاض - خطأ
- ٤٢ يرجع السبب في اطماء الأفرع الغربية لدلتا النيل إلى نمو الحشائش البرية وعدم تطهير المجاري المائية- صواب.
- ٤٣ - تختلف خصائص المياه في سطح بحيرة ناصر عن المياه في قاعها - صواب
- ٤٤ اثبتت الدراسات العلمية أن جسم السد العالي لن يتأثر بالهزات الأرضية في منطقة بناؤه - صواب
- ٤٥ -يؤثر إختلاف درجة شفافية المياه وحجم العكارة في مياه بحيرة ناصر على الإنتاج السمكي بالبحيرة - صواب
- ٤٦ - زادت معدلات تجريف التربة المصرية بعد بناء السد العالي - صواب
- ٤٧ - توجد علاقة طردية بين بناء السد العالي وزيادة خصوبة التربة المصرية - خطأ
- ٤٨ تزيد نسبة ملوحة التربة في شمال الدلتا وتقل كلما اتجهنا جنوباً - صواب
- ٤٩ -أطلق اسم نهر ( ستيت) تيمناً باسم ( عين سبأ ) اليمينية - خطأ
- ٥٠ توجد المنابع الشتوية لنهر النيل في إثيوبيا - خطأ
- ٥١ تزيد مساحة حوض نهر النيل عن مساحة حوض نهر الكونغو - خطأ
- ٥٢ يصل لنهر النيل حوالي ٨٠ مليار م<sup>٣</sup> من المياه سنوياً من بحيرة فيكتوريا- خطأ
- ٥٣ ترتبط نشأة بحيرة كايوجا- بالحركة المكونة للاخدود الإفريقي العظيم - خطأ
- ٥٤ تبلغ نسبة سكان الريف في السودان ٨٥% من إجمالي السكان - خطأ
- ٥٥ اتصلت بحيرة فكتوريا بنهر النيل منذ حوالي ١٥ الف سنة - خطأ
- ٥٦ في رأي علمي - تكونت بعض سواحل فلسطين الجنوبية من الرواسب النيلية - صواب
- ٥٧ -تقع بسطة وادي حلفا النيلية - في منطقة قليلة المطر - صواب
- ٥٨ من مقترحات مشروعات التخزين القرني بناء سد - الروصيرص- على نهر العطرة - صواب
- ٥٩ - تمتد البسطة الرابعة من بسطات نهر النيل ما بين جوبا إلى الخرطوم - صواب
- ٦٠ توقف العمل في قناة جونجلي بسبب الحروب الأهلية التي نشأت في أثيوبيا- خطأ

**انتهت الأسئلة**

**خالص تمنياتي بالنجاح**

**أ.د/ إفراج عزب باشا**

